

Assunto: **Pregão Presencial 006/2021 - Pedido de esclarecimento**
De: Ribeiro <rafael.ribeiro@nunesfarma.com.br>
Para: licitacoes <licitacoes@camposdojordaio.sp.gov.br>
Data: 29/03/2021 10:53
Prioridade: Mais alta



- RENAME 2020 - SULFATO DE ZINCO.pdf (~27 KB)
- Bula Neshzinco cx 30 comp.pdf (~2.5 MB)
- CMED - SULFATO DE ZINCO.pdf (~77 KB)
- Registro Anvisa Nesh Zinco - 2029.pdf (~66 KB)
- Esclarecimento Zinco - Campos do Jordão.pdf (~181 KB)

Boa Tarde,
segue pedido de esclarecimento para o item 038 do referido edital.

Atenciosamente;

Rafael Heisler Ribeiro dos Santos

Assistente Administrativo

rafael.ribeiro@nunesfarma.com.br

+55 41 2141 4143

NUNESFARMA Laboratório NESH

"Desde 1980 Saúde. Tradição. Inovação." "Since 1980 Health. Tradition. Innovation."

www.nunesfarma.com.br



Para segurança:

Este e-mail é exclusivo para assuntos profissionais da Nunesfarma Nesh. Por favor, mantenha confidencial as informações recebidas & certifique-se que este e-mail foi enviado de uma conta @nunesfarma.com.br / não utilizamos e-mails gratuitos como @gmail; @hotmail @icloud ou similares. Novamente, certifique-se disso antes de abrir um eventual anexo ou tomar uma decisão sobre a mensagem recebida.

Em caso de dúvida ligue ou mande WhatsApp para [\(41\) 9 9214-4100](tel:(41)99214-4100)

For safety:

This email is for Nunesfarma Nesh professional affairs only. Please keep the information you receive confidential & make sure this email was sent from an @nunesfarma.com.br account / we do not use free emails like @gmail; @hotmail @icloud or similar. Again, make sure of this before opening any attachments or making a decision about the message you received.

If in doubt call or send WhatsApp to [+55 \(41\) 9 9214-4100](tel:+55(41)99214-4100)

A
Prefeitura de Campos do Jordão
Estado de São Paulo
Ref.: Pregão Presencial nº 006/2021
Processo Administrativo nº 4.989/2021

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA., inscrita no CNPJ nº 75.014.167/0001-00, com sede na Rua Almirante Gonçalves, 2.247 – Curitiba/PR vem respeitosamente a esta comissão solicitar, conforme legislação pertinente, o devido esclarecimento do **Item 038** do referido edital.

O edital dispõe referente ao item 038:

Sulfato de zinco 50 mg

- 1) De acordo com a tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) e o RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) que regula o mercado farmacêutico consta que o correto para o descritivo deste item seria **sulfato de zinco 10mg ou 20mg**. Em anexo.
- 2) Cabe ainda que em pesquisa na CMED e RENAME, não encontramos um produto no mercado que atenda ao descritivo do edital.
- 3) Pelos fatos expostos acima, servimo-nos do presente para solicitar que seja alterado descritivo do referido item para se adequar a tabela CMED ou RENAME.
- 4) Caso não seja do interesse da prefeitura alterar o descritivo do item, possuímos o produto Nesh Zinco o qual possui a apresentação de sulfato de zinco 54,89 mg equivalente a 20mg de zinco elementar comprimido sulcado. Poderemos ofertar o nosso produto?

Ressaltamos que o esclarecimento solicitado é de fundamental entendimento para o correto desenvolvimento da licitação.

Curitiba, 23 de março de 2021.


Felipe Maximiliano
R.G 9.685.066-2
CPF 086.167.359-56
Vendedor SP

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: NESH ZINCO

Nome da Empresa Detentora do Registro	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	CNPJ	75.014.167/0001-00	Autorização	1.01.795-2
Processo	25351.133898/2014-74	Categoria Regulatória	Específico	Data do registro	15/12/2014
Nome Comercial	NESH ZINCO	Registro	117950003	Vencimento do registro	12/2029
Princípio Ativo	SULFATO DE ZINCO			Medicamento de referência	SULFATO DE ZINCO
Classe Terapêutica	OUTROS SUPLEMS MINERAIS EXCETO DE FERRO E P/ REHIDRATAÇÃO			ATC	OUTROS SUPLEMS MINERAIS EXCETO DE FERRO E P/ REHIDRATAÇÃO
Parecer Público	-	Bula Paciente		Bula Profissional	

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	20 MG COM SUS CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1179500030010	COMPRIMIDO DISPERSIVEL	15/12/2014	36 meses
Princípio Ativo	SULFATO DE ZINCO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA () 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: MEDICAMEN BIOTECH LIMITED Endereço: SP - 1192 A& B, PHASE - IV - INDUSTRIAL ÁREA - ÍNDIA Etapa de Fabricação: 				

Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	20 MG COM SUS CT BL AL PLAS TRANS X 100 <input type="checkbox"/> ATIVA	1179500030029	COMPRIMIDO DISPERSIVEL	15/12/2014	36 meses

GGREM	Medicamento (Laboratório)	Apresentação	ICMS 0%		ICMS 12%		ICMS 17%		ICMS 17,5%		ICMS 18%		ICMS 20%	
			PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO DE VINCRISTINA														
538019110028207	DABAZ (ACCORD)	1 MG/ML SOL INJ FA VD TRANS X 2 ML	41,64	33,27	47,32	37,81	50,17	40,09	50,47	40,33	50,78	40,58	52,05	41,59
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO DE ZINCO														
504612100014004	COLÍRIO NEO BRASIL (BRAINFARMA QUÍMICA E S.A)	(0,15 + 0,30) MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS PEBD/PEAD TRANSL X 20ML (**)	7,74	6,19	8,94	7,14	9,56	7,64	9,63	7,70	9,70	7,75	9,98	7,98
542515120000504	NESH ZINCO (NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE FARMACÊUTICOS)	20 MG COM SUS CT BL AL PLAS TRANS X 30 (**)	26,26	20,98	30,35	24,25	32,45	25,93	32,68	26,11	32,91	26,30	33,86	27,06
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO DE ZINCO HEPTAIDRATADO														
510415901171413	COLÍRIO GEOLAB (GEOLAB)	0,15 MG + 0,3 MG SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 20 ML (**)	7,60	6,07	8,78	7,02	9,39	7,50	9,46	7,56	9,52	7,61	9,80	7,83
513216020001104	NEO-ZINCTRACE (INPHARMA LABORATORIOS)	0,2 MG/ML SOL INJ IV CX 25 FA VD INC X 5 ML	159,48	127,44	184,29	147,27	197,07	157,48	198,45	158,58	199,85	159,70	205,63	164,32
513220030000907	ZINCTRACE (INPHARMA LABORATORIOS)	1 MG/ML SOL DIL INFUS IV FR VD INC X 5 ML	31,90	25,49	36,86	29,45	39,42	31,50	39,70	31,72	39,97	31,94	41,13	32,87
502416100023705	UNIZINCO (ATIVUS)	17,60 MG/ML SOL FR PLAS AMB X 100 ML + COP	15,35	12,27	17,74	14,18	18,97	15,16	19,10	15,26	19,24	15,37	19,79	15,81
575219060002617	UNIZINCO (MYRALIS)	17,60 MG/ML SOL FR PLAS AMB X 100 ML + COP	15,85	12,67	18,32	14,64	19,59	15,65	19,72	15,76	19,86	15,87	20,44	16,33
575219060002517	UNIZINCO (MYRALIS)	17,60 MG/ML SOL FR PLAS AMB X 30 ML + COP	4,75	3,80	5,49	4,39	5,87	4,69	5,91	4,72	5,95	4,75	6,12	4,89
540600501151316	SULFATO DE ZINCO (CASULA & VASCONCELOS E COMÉRCIO)	200 MCG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD INC X 5 ML	332,21	265,47	377,51	301,67	400,25	319,84	402,68	321,78	405,13	323,74	415,26	331,83
509514090029107	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 1206 ML SIST FECH	469,17	374,91	542,17	433,25	579,77	463,29	583,82	466,53	587,92	469,81	604,94	483,41
509514090028907	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 1448 ML SIST FECH	563,33	450,16	650,98	520,20	696,12	556,27	700,98	560,15	705,92	564,10	726,35	580,43
509514090028507	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 1477 ML SIST FECH	572,17	457,22	661,19	528,36	707,05	565,00	711,98	568,94	716,99	572,95	737,75	589,54
509514090029007	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 1904 ML SIST FECH	740,73	591,92	855,98	684,01	915,34	731,45	921,73	736,55	928,22	741,74	955,09	763,21
509514090028607	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 1970 ML SIST FECH	765,24	611,50	884,30	706,64	945,63	755,65	952,23	760,93	958,93	766,28	986,69	788,46
509514090028707	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 2463 ML SIST FECH	958,29	765,77	1107,39	884,92	1184,19	946,29	1192,46	952,89	1200,84	959,59	1235,61	987,38
509514090028807	SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI BRASIL)	EMUL INJ IV BOLS PLAS TRANS X 986 ML SIST FECH	385,76	308,26	445,78	356,22	476,69	380,92	480,02	383,58	483,40	386,28	497,40	397,47
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO DE ZINCO MONOIDRATADO														
575220010004207	UNIZINCO COMPRIMIDO (MYRALIS)	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10 (**)	44,35	35,44	51,25	40,95	54,80	43,79	55,19	44,10	55,58	44,41	57,18	45,69
575220010004507	UNIZINCO COMPRIMIDO (MYRALIS)	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 14 (**)	62,08	49,61	71,74	57,33	76,71	61,30	77,25	61,73	77,79	62,16	80,05	63,97
575220010004307	UNIZINCO COMPRIMIDO (MYRALIS)	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 (**)	133,04	106,31	153,74	122,85	164,40	131,37	165,55	132,29	166,71	133,22	171,54	137,08
575220010004107	UNIZINCO COMPRIMIDO (MYRALIS)	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 (**)	17,74	14,18	20,50	16,38	21,92	17,52	22,07	17,64	22,23	17,76	22,87	18,28
575220010004407	UNIZINCO COMPRIMIDO (MYRALIS)	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 (**)	266,07	212,62	307,47	245,70	328,79	262,74	331,09	264,57	333,42	266,44	343,07	274,15
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO DE ZINCO;NITRATO DE NAFAZOLINA														
523400501172415	MAXIBELL (LATINOFARMA INDUSTRIAS S)	(0,5 + 4,0) MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML	8,06	6,44	9,31	7,44	9,96	7,96	10,03	8,01	10,10	8,07	10,39	8,30
506719050077917	MAXIBELL (CRISTÁLIA QUÍMICO)	(0,5 + 4,0) MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML	8,32	6,65	9,61	7,68	10,28	8,21	10,35	8,27	10,43	8,33	10,73	8,57
PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FERROSO														
522101004136414	LOMFER (S OSÓRIO DE MORAES)	10 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML (**)	7,70	6,15	8,90	7,11	9,52	7,61	9,58	7,66	9,65	7,71	9,93	7,94
503405802133410	SULFERBEL (BELFAR)	125 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC X 30ML (**)	6,95	5,55	8,03	6,42	8,59	6,86	8,65	6,91	8,71	6,96	8,96	7,16
522101003131419	LOMFER (S OSÓRIO DE MORAES)	25 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 30 ML (**)	6,20	4,95	7,16	5,72	7,66	6,12	7,72	6,17	7,77	6,21	7,99	6,38
511605901136414	FERSIL (HIPOLABOR)	25 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 30 ML (EMB HOSP) (**)	1263,69	1009,81	1460,30	1166,93	1561,58	1247,86	1572,48	1256,57	1583,54	1265,41	1629,39	1302,05

(1) O PMVG é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. O Preço Fábrica é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP.

(2) Alíquotas de ICMS 20% - RJ; ICMS 18% - AM, AP, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE, SP, TO e RJ (medicamentos da Portaria MS 1318/2002); ICMS 17,5% - RO; ICMS 17% - Demais Estados; ICMS 12% - Medicamentos Genéricos de SP e MG. Áreas de Livre Comércio - ALC - : Manaus/Tabatinga (AM), Boa Vista/Bonfim (RR), Macapá/Santana (AP), Guajará-Mirim (RO), Brasília/Epitaciolândia/ Cruzeiro do Sul (AC) - medicamentos isentos de ICMS conforme convênios 87 e 140 do CONFAZ ou Laboratórios oficiais.

(*) Medicamento liberado dos critérios de estabelecimento e ajuste de PF, mas sujeito ao monitoramento do PMC, nos termos da Resolução CMED nº 2, de 20 de março de 2019.

(**) O preço da apresentação de Código GGREM 511518120069307 foi alterado em virtude de decisão judicial (Processo nº 1033925-38.2019.4.01.0000 - 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

(4) Os preços das apresentações de Código GGREM504402406154416, 504402409153410, 504416120060007, 504416120060307, 504416120060907, 504417100064907 estão em conformidade com decisão judicial do Processo nº 5005914-14.2019.4.03.6130 da 1ª Vara Federal de Osasco).

(5) Os preços do medicamento Código GGREM 524616090002307 estão determinados em virtude de decisão judicial (Processo nº 1020937-33.2020.4.01.3400 - 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal).

(6) Os preços do medicamento Código GGREM 510120070005907 estão determinados em virtude de decisão judicial (Processo nº 1034027-11.2020.4.01.3400 - 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal).

NeshZinco

sulfato de Zinco 54,89mg
equivalente a 20mg de
Zinco elementar

Nesh

APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: Comprimidos para suspensão
Cartucho contendo 3 blisters contendo 10 comprimidos para suspensão cada

**USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO:**

Cada comprimido para suspensão contém:
sulfato de Zinco (Equivalente a 20 mg de Zinco elementar)..... 54,89 mg
Excipientes q.s.p. 1 comprimido para suspensão
(amido, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, talco, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio,

Componentes do NeshZinco	Posologia	Dose diária fornecida conforme posologia recomendada	% INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (IDR) - RDC 269/05					
			0-6 meses	7-11 meses	1-3 anos	4-6 anos	7-10 anos	adultos
Sulfato de Zinco	0,5 (meio comprimido)	27,45 mg (equivalente a 10 mg de Zinco elementar)	357,14%	*	*	*	*	*
	1 (um comprimido)	54,89 mg (equivalente a 20 mg de Zinco elementar)	*	487,80%	487,80%	392,16%	357,14%	285,71%

* Posologia não recomendada para a respectiva faixa etária.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Uso Adulto: NeshZinco está indicado como suplemento mineral em dietas restritivas e inadequadas e em doenças crônicas ou convalescença (período de recuperação após intervenção cirúrgica ou doenças debilitantes).

Uso Pediátrico: NeshZinco está indicado como preventivo e como auxiliar da terapia de reidratação oral de diarreia aguda e persistente.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O mineral Zinco não é produzido pelo organismo, e, portanto, deve ser obtido de fontes externas, sendo que suas deficiências podem comprometer o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o NeshZinco fornece, aos indivíduos, a quantidade necessária de Zinco, podendo ser indicado nos casos de dietas restritivas e inadequadas.

A falta de Zinco e a diminuição da função do sistema imunológico estão relacionadas ao aumento da ocorrência de casos de diarreia.

Embora o exato modo de ação do Zinco no tratamento e prevenção da diarreia não seja completamente conhecido, muitos efeitos do Zinco podem explicar seu funcionamento: 1) Zinco estimula o sistema imunológico (sistema de defesa do corpo); 2) Zinco aumenta a recuperação do tecido intestinal e o nível de enzimas presentes na sua superfície; 3) o efeito de diminuição de secreção de substâncias relacionadas a digestão foi demonstrado em modelos animais.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao sulfato de Zinco ou a qualquer um dos componentes do NeshZinco.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

O QUE DEVO SABER ANTES USAR ESTE MEDICAMENTO?**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Gravidez: baixos níveis de Zinco no sangue podem causar problemas na gravidez ou defeitos no bebê. Entretanto, tomar grandes quantidades de suplementos na gravidez, pode ser perigoso para a mãe e para o feto, devendo ser evitado.

Lactação: É importante a administração da quantidade certa de vitaminas e minerais necessários para o lactante crescer devidamente. Entretanto, tomar grandes quantidades de suplementos, durante o período da amamentação, pode ser perigoso para a mãe e para o bebê, devendo ser evitado.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Atenção feniletonúricos: Contém fenilalanina.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

INTERAÇÕES

Interação Severa: O Zinco diminui o efeito de antibióticos como tetraciclínas.

Interação Moderada: Suplementos orais de ferro podem ter sua ação diminuída pela administração do Zinco. O Zinco também pode diminuir o efeito de outros fármacos como a cloroquina, hidroxiquina, bifosfonatos e quinolonas orais.

NeshZinco pode ainda alterar o efeito dos seguintes medicamentos:

- Penicilina (usado para tratamento de reumatismo e certas doenças metabólicas [doença de Wilson, Cistinúria])
- Valproato de sódio (usado para tratar convulsões) ou
- Etambutol (usado para tratar tuberculose)

Medicamentos contendo Zinco podem interferir na ação de certos antibióticos como tetraciclínas, cefalosporinas ou cefbuteno. Recomenda-se um intervalo de 03 (três) horas entre a ingestão de Zinco e esses medicamentos.

Medicamentos contendo Zinco também podem alterar o efeito de medicamentos fitoterápicos (medicamentos à base de plantas medicinais) e vitaminas.

O Zinco quando combinado com certos alimentos pode não ser absorvido, por isso, os seguintes alimentos devem ser evitados ou ingeridos duas horas após a tomada do Zinco: farelo, alimentos contendo fibra, alimentos contendo fósforo como leite ou aves domésticas e cereais integrais.

Não administrar suplementos de Zinco, cobre e ferro ou suplemento de fósforo ao mesmo tempo. O melhor é espaçar estes produtos por duas horas, para ter total benefício da suplementação da dieta. Acúmulo de Zinco pode ocorrer em casos de falência renal.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 36 meses, indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O medicamento NeshZinco se apresenta como comprimidos brancos ou quase brancos, redondos, lisos, não revestidos, com a borda chanfrada, sulcados em um dos lados. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso Adulto: Uma vez ao dia, dissolver 01 (um) comprimido para suspensão de NeshZinco em ½ copo de água (100 ml), agitar com auxílio de uma colher e tomar. Se necessário você pode colocar mais um pouco de água no copo, mexer com a colher e tomar em seguida. Este medicamento deve ser utilizado apenas por via oral. O uso deste medicamento por outra via que não a oral, pode causar a inefetividade do medicamento ou mesmo promover danos à saúde.

Uso Pediátrico: Crianças abaixo de 6 meses – administrar ½ (meio) comprimido por dia pelo período de 10-14 dias, da seguinte forma: os comprimidos devem ser partidos ao meio conforme sulco e a metade pode ser dispersa na solução de reidratação oral ou na água, em uma pequena colher.

Crianças acima de 6 meses – administrar 1 (um) comprimido por dia pelo período de 10-14 dias. O comprimido pode ser disperso em solução de reidratação oral ou em água, em uma colher. Crianças maiores podem mastigar ou engolir os comprimidos com água, ou ainda dissolver em ½ (meio) copo de água (100 ml), agitar com auxílio de uma colher e tomar. Se necessário você pode colocar mais um pouco de água no copo, mexer com a colher e tomar em seguida. Este medicamento deve ser utilizado apenas por via oral. O uso deste medicamento por outra via que não a oral, pode causar a inefetividade do medicamento ou mesmo promover danos à saúde.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Podem ocorrer reações como: dor abdominal com cólicas, desordem do sistema digestivo, dispênia (indigestão), leucopenia (diminuição de células de defesa no sangue), náuseas (enjôo), desordem neutropênica (diminuição de células de defesa no sangue) e anemia sideroblástica (febre, calafrios, dor de garganta, feridas na boca, cansaço e tontura não usual).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Em caso de usar uma quantidade maior do que a indicada, interrompa o uso do medicamento e procure ajuda médica para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para **0800 722 6001**, se você precisar de mais orientações.

MS: 1.1795.0003

Importado por: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.

Rua Almirante Gonçalves, 2247 • Água Verde
CEP: 80250-150 • Curitiba – PR
CNPJ: 75.014.167/0001-00

SAC (41) 2141-4100

Responsável Técnico:

Pâmela Fernandes Kaseker: CRF-PR nº 16.297

Fabricado por: Medicamen Biotech Ltd.

SP-1192, A&B, Phase-IV – Industrial Area
Bhiwadi 301019, Alwar District, Rajasthan, India.
Telefones: +91 11 27240578, 27240610 e 27463506
Fax: +91 11 27138171

SAC (41) 2141-4100
sac@nunesfarma.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 04/04/2016.

BUNZAPP • 203,2x554mm • 2,16(A)

guilherme rodrigues
designer

(19) 98114-8600

gui.rodrigues.design@gmail.com

guilfrembrasil.wix.com/portfolio

Cliente:

Nunesfarma
Saúde. Tradição. Inovação.

Bula NeshZinco Paciente

Formato: L203,5x4554mm

Código do item: BUNZAPP

Nome do arquivo: bula_neshzinco_adultopediatrico_216(A).ai

Plataforma: MacOS/illustrator

Revisão da arte: 2,16 (A)

Código binário: 100100101 (125)

Data de finalização: 27/05/2016

Cores:

Pantone Black C

Atenção: as cores das provas geradas a partir de impressoras

inkjet ou laser são apenas indicativas. A impressão final

deverá obedecer o padrão especificado na legenda.

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
sulfato de gentamicina	5 mg/g	pomada oftálmica
	5 mg/mL	solução oftálmica
sulfato de magnésio	–	pó para solução oral
	10% (0,81 mEq/mL Mg++)	solução injetável
	50% (4,05 mEq/mL Mg++)	solução injetável
sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetonida + cloridrato de lidocaína	10.000 ui/ml + 3,500 mg/ml + 0,250 mg/ml + 20 mg/ml	solução otológica
sulfato de salbutamol	100 mcg/dose	aerossol oral
	5 mg/mL	solução para inalação
	0,5 mg/mL	solução injetável
sulfato de zinco	200 mcg/mL	solução injetável
	10 mg	comprimido mastigável
	4 mg/mL	xarope
sulfato ferroso	5 mg/mL	xarope
	25 mg/mL	solução oral
	40 mg	comprimido
tartarato de metoprolol	100 mg	comprimido
teclozana	500 mg	comprimido
	10 mg/mL	suspensão oral
unha-de-gato [<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.)]	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	cápsula
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	comprimido
	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	gel
varfarina sódica	1 mg	comprimido
	5 mg	comprimido



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Folha de Informações e Despacho

Processo n.º 4.989/2021

Folha n.º _____

Rubrica _____

Valnália Georgana M. Borely

Diretora de Licitações e Compras

Referente ao PP 006/2021, Processo 4.989/2021, item 038, informamos que nosso interesse nesse processo, é adquirir o sulfato de zinco 50mg. Caso não tenha o mesmo poderá ser ofertado manipulado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

29 de Março de 2021



Dr. Marcus Vinicius Maia de Rezende
Secretário de Saúde